



## Wichtige Information zur Kaninchenimpfung

Mit dem Frühjahr beginnt wieder die Stechmückensaison. **Stechmücken sind Überträger der Myxomatose**, einer meist **tödlichen Erkrankung bei Kaninchen** verursacht durch Viren der Pockengruppe. Daher empfehlen wir eine **Impfung** vor Beginn der wärmeren Jahreszeit. Da der Impfschutz nur für 6 Monate gewährleistet wird und die Stechmücken auf Grund der wärmer werdenden Winter bis in den Dezember hinein aktiv sind, sollte für die Myxomatose eine Auffrischungsimpfung bereits im September/Okttober erfolgen.

Auch gegen die **hämorrhagische Kaninchenkrankheit RHD** empfehlen wir dringend eine Impfung, da es sich ebenfalls um eine meist tödlich verlaufende Erkrankung handelt, bei der es zu Blutungen v.a. im Magen-Darm-Bereich kommt. Bei dieser Erkrankung hält der Impfschutz ein Jahr lang.

Zur Grundimmunisierung im ersten Impfstoffjahr empfehlen wir für beide Erkrankungen 2 Impfungen im Abstand von etwa 3 - 4 Wochen, danach erfolgt eine jährliche Auffrischung zum Erhalt eines zuverlässigen Impfschutzes.

Wir bieten Ihnen spezielle **Kaninchen - Impftermine außerhalb der regulären Ordinationszeiten** an. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich!

Bitte bedenken Sie, daß für die **Grundimmunisierung bei noch ungeimpften Tieren 2 Termine im Abstand von 3 - 4 Wochen** nötig sind.

Die Impfeempfehlungen entsprechen den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kleintiermedizin unter der wissenschaftlichen Ausarbeitung von Prof. Dr. Katrin Hartmann, München, Prof. Dr. Marian Horzinek, Utrecht, Prof. Dr. Hans Lutz, Zürich, PD Dr. Reinhard Straubinger, Leipzig, Prof. Dr. Uwe Truyen, Leipzig sowie Dr. Karin Duchow, Paul-Ehrlich-Institut, Langen Juli 2006